



Una vacuna contra seis enfermedades infantiles,

Vaxelis™ ayuda a proteger a su bebé con menos vacunas*

*Durante la serie de vacunación en los primeros 6 meses de vida de su bebé.

VAXELIS es una vacuna que se administra para proteger a su hijo de la difteria, el tétanos (trismo), la tos ferina (tos convulsiva), la poliomieltis, la Hib (*Haemophilus influenzae* tipo b) y la hepatitis B. Su hijo no se puede contagiar de ninguna de estas enfermedades con VAXELIS. VAXELIS podría no proteger completamente a su hijo de estas enfermedades.

Información de Seguridad Importante

Su hijo no debe recibir VAXELIS si:

- es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- tuvo una reacción alérgica a cualquier vacuna anterior contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomieltis, la Hib o la hepatitis B.

(Continúa en la página siguiente)



Vaxelis™

Diphtheria and Tetanus Toxoids
and Acellular Pertussis, Inactivated
Poliovirus, Haemophilus b Conjugate
and Hepatitis B Vaccine



¿De qué ayuda VAXELIS a protegerse?

VAXELIS es una vacuna que puede ayudar a proteger a su hijo de las siguientes enfermedades:

Difteria

- puede dificultar la respiración
 - puede causar insuficiencia cardíaca
-

Trismo (tétanos)

- puede causar una contracción dolorosa de los músculos de la mandíbula, lo que dificulta abrir la boca o tragar
-

Tos ferina (tos convulsiva)

- puede causar una tos terrible que puede dificultar la respiración, el ingerir alimentos o bebidas
 - en bebés pequeños, puede causar neumonía, convulsiones y daño cerebral
-

Poliomielitis

- puede paralizar los brazos o las piernas
- puede dificultar la respiración

Hib (*Haemophilus influenzae* tipo b)

- puede causar una enfermedad leve, como infecciones de oído o bronquitis, o una enfermedad grave, como infecciones del torrente sanguíneo
 - puede causar neumonía o hinchazón grave en la garganta, lo que dificulta la respiración; o infecciones de la sangre, las articulaciones, los huesos y la membrana que recubre el corazón. A veces, incluso puede causar la muerte
-

Hepatitis B

- puede permanecer en el cuerpo durante mucho tiempo y causar infecciones de por vida
- puede causar cicatrización del hígado (cirrosis) y, a veces, cáncer de hígado

Información de Seguridad Importante (*continuación*)

Su hijo no debe recibir VAXELIS si:

- tuvo una reacción grave que afectó el cerebro y el sistema nervioso después de una vacuna contra la tos ferina.
- tiene una enfermedad cerebral y nerviosa que está empeorando.



Diphtheria and Tetanus Toxoids
and Acellular Pertussis, Inactivated
Poliovirus, Haemophilus b Conjugate
and Hepatitis B Vaccine



¿Cómo se administra VAXELIS?

Su hijo puede recibir VAXELIS al mismo tiempo que recibe sus otras vacunas.



Si a su hijo le falta una inyección de VAXELIS, su proveedor de atención médica puede sugerirle un cronograma de actualización.



Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis, Inactivated Poliovirus, Haemophilus b Conjugate and Hepatitis B Vaccine

Notas

Use esta sección para llevar un registro de cuándo su bebé recibe VAXELIS.



Fecha de la primera inyección:



Fecha de la segunda inyección:



Fecha de la tercera inyección:

Información de Seguridad Importante (continuación)

Antes de que su hijo reciba VAXELIS, informe a su proveedor de atención médica si su hijo:

- tuvo problemas con las vacunas contra estas enfermedades.
- está tomando esteroides, recibiendo tratamiento para el cáncer o tiene otro problema que debilita el sistema inmunitario.

Los efectos secundarios más frecuentes de VAXELIS son los siguientes:

- dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se aplicó la inyección
- fiebre (100.4 °F o más alta)
- llorar más de lo habitual
- comer menos de lo habitual
- más irritabilidad de lo habitual
- más somnolencia de lo habitual
- vómitos

(Continúa en la página siguiente)

Es importante que su hijo complete la serie de vacunación de 3 dosis de VAXELIS.



¿Qué más debo saber acerca de VAXELIS?

¿Qué es VAXELIS?

VAXELIS es:

una inyección para bebés.

una vacuna que se administra para proteger a su hijo de la difteria, el tétanos (trismo), la tos ferina (tos convulsiva), la poliomielitis, la Hib (*Haemophilus influenzae* tipo b) y la hepatitis B.

generalmente se administra a los 2, 4 y 6 meses de edad.

Su hijo NO PUEDE contraer las enfermedades a través de la vacuna.

Información de Seguridad Importante (*continuación*)

Puede haber otros efectos secundarios que no se enumeran en esta lista. Si su hijo tiene algún efecto secundario que le preocupa o que parece empeorar, infórmese al proveedor de atención médica de su hijo de inmediato.



Diphtheria and Tetanus Toxoids
and Acellular Pertussis, Inactivated
Poliovirus, Haemophilus b Conjugate
and Hepatitis B Vaccine

Con VAXELIS, los niños reciben al menos de **2 a 3** inyecciones menos durante los primeros 6 meses de vida que con otras vacunas recomendadas rutinariamente.

Todos los ingredientes de VAXELIS se han utilizado ampliamente en otras vacunas durante años. En general, el uso de vacunas combinadas está respaldado por la Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

VAXELIS podría no proteger completamente a su hijo de estas enfermedades.

Información de Seguridad Importante (*continuación*)

Su hijo no debe recibir VAXELIS si:

- es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- tuvo una reacción alérgica a cualquier vacuna anterior contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, la Hib o la hepatitis B.
- tuvo una reacción grave que afectó el cerebro y el sistema nervioso después de una vacuna contra la tos ferina.
- tiene una enfermedad cerebral y nerviosa que está empeorando.

(Continúa en la página siguiente)



¿Por qué mi hijo necesita una vacuna como VAXELIS?

Las vacunas han ayudado a hacer que las enfermedades prevenibles sean mucho menos frecuentes, pero los niños aún están en riesgo.

La vacunación a tiempo durante toda la infancia es esencial para ayudar a brindar protección contra enfermedades graves.

Los niños pueden estar expuestos a estas enfermedades de varias maneras, incluso a través del contacto con personas infectadas y/o cosas contaminadas.

Es mejor ayudar a prevenir una enfermedad que tratarla.

La mayoría de las guarderías, los programas de educación preescolar, las escuelas y los campamentos requieren registros de vacunas infantiles actualizadas.

VAXELIS ayuda a proteger contra seis enfermedades infantiles graves.

Notas

Use esta sección para tomar notas durante su visita al consultorio.

Información de Seguridad Importante (*continuación*)

Antes de que su hijo reciba VAXELIS, informe a su proveedor de atención médica si su hijo:

- tuvo problemas con las vacunas contra estas enfermedades.
- está tomando esteroides, recibiendo tratamiento para el cáncer o tiene otro problema que debilita el sistema inmunitario.

Los efectos secundarios más frecuentes de VAXELIS son los siguientes:

- dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se aplicó la inyección
- fiebre (100.4 °F o más alta)
- llorar más de lo habitual
- comer menos de lo habitual
- más irritabilidad de lo habitual
- más somnolencia de lo habitual
- vómitos



Diphtheria and Tetanus Toxoids
and Acellular Pertussis, Inactivated
Poliovirus, Haemophilus b Conjugate
and Hepatitis B Vaccine



¿Quién no debe recibir VAXELIS?

Hable con su proveedor de atención médica para asegurarse de que su hijo pueda recibir VAXELIS de manera segura.

Su hijo **NO** debe recibir VAXELIS si:

- es alérgico a cualquiera de sus ingredientes
- tuvo una reacción alérgica a cualquier vacuna anterior contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, la Hib o la hepatitis B
- tuvo una reacción grave que afectó el cerebro y el sistema nervioso después de una vacuna contra la tos ferina
- tiene una enfermedad cerebral y nerviosa que está empeorando

Si su hijo ha tenido alguna de estas cosas después de una inyección, infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato.

Puede haber otros efectos secundarios que no se enumeran en esta lista. Si su hijo tiene algún efecto secundario que le preocupa o que parece empeorar, infórmele al proveedor de atención médica de su hijo de inmediato.

Antes de que su hijo reciba esta vacuna, informe a su proveedor de atención médica si:

- su hijo tuvo problemas con otras vacunas contra estas enfermedades
- si su hijo está tomando esteroides, recibiendo tratamiento para el cáncer o tiene otro problema que debilita el sistema inmunitario

Si aún tiene preguntas sobre VAXELIS o sobre el cronograma de vacunas, no dude en preguntarle a su proveedor de atención médica.



Diphtheria and Tetanus Toxoids
and Acellular Pertussis, Inactivated
Poliovirus, Haemophilus b Conjugate
and Hepatitis B Vaccine

Lea la [Información para el Paciente](#) o [Patient Information](#) para VAXELIS que se adjunta y hable al respecto con su médico. También está disponible la [Información de Prescripción](#) o [Prescribing Information](#) para el médico.



Vaxelis™

Diphtheria and Tetanus Toxoids
and Acellular Pertussis, Inactivated
Poliovirus, Haemophilus b Conjugate
and Hepatitis B Vaccine

Copyright © 2021 MSP Vaccine Company.
Todos los derechos reservados.
US-VAX-00464 07/21



SANOFI PASTEUR

